

ด่วนที่สุด

ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๐๑



ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ, นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๔๘๐๖

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคคอตีบแอฟริกาในสุกรของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารงานและขับเคลื่อนมาตรการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนและได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคคอตีบแอฟริกาในสุกรแห่งชาติ เพื่อกำหนดนโยบายและแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและผู้ได้รับผลกระทบ การอำนวยความสะดวกโลตามแผนเตรียมความพร้อมฯ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประกอบกับพบการระบาดของโรคคอตีบแอฟริกาในสุกรในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโรคคอตีบแอฟริกาในสุกรเข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ หรือเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร ทราบและพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. โรคคอตีบแอฟริกาในสุกร เป็นโรคไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่เป็นอันตรายต่อสุกรเนื่องจากเป็นโรคแล้วตายไม่มีทางรักษา เชื้อมีความคงทนในสิ่งแวดล้อมหลายปี เมื่อสัตว์ติดโรคแล้วมีโอกาสตายสูงและเป็นพาหะได้ตลอดชีวิตเชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิต โรคนี้มีความรุนแรงทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบร้อยละ ๑๐๐

๒. สุกรติดโรคได้จากการสัมผัสหรือได้รับเชื้อโดยตรงจากสุกรป่วย (Direct contact) ติดต่อกันโดยอ้อม (Indirect contact) โดยได้รับเชื้อปนเปื้อนในอาหาร คน ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เสื้อผ้าที่ปนเปื้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินเศษอาหารที่มีเนื้อสุกรที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสผสมอยู่ หรือติดต่อกันโดยเห็บอ่อนกัด (genus Ornithodoros) ซึ่งพบในสุกรป่า เมื่อสุกรติดเชื้อมีระยะฟักตัวนาน ๕ - ๑๕ วัน สุกรจะมีอาการไข้สูงนอนสุมกันร่วมกับท้องเสียเป็นเลือด ผิวน้ำแดง มีจุดเลือดออกเป็นรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง ใจ แห้งและขาหลังไม่มีแรง โดยสุกรมีอัตราการตายร้อยละ ๑๐๐ เมื่อแสดงอาการ

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ขอความร่วมมือกับปศุสัตว์ในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังการนำเข้าสุกรมีชีวิต ซากสุกร และผลิตภัณฑ์จากสุกรในประเทศที่มีการระบาดเข้าประเทศไทย

๔. แจ้งคำแนะนำเกษตรกรในการเฝ้าระวังโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกร โดยสังเกตอาการสุกรทุกวัน หากพบการตายของสุกรแบบเฉียบพลันมากกว่าร้อยละ ๕ ใน ๒ วัน หรือในฟาร์มย่อยที่มีจำนวนสุกรน้อยกว่า ๕๐ ตัว มีการตายเฉียบพลัน ตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน หรือ สุกรมีอาการป่วย ตามข้อ ๒ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อำเภอ หรือ call center : ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือ application DLD 4.0

๕. ประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan) และแนวทางเวชปฏิบัติของอหิวด์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline) ให้ประชาชนในพื้นที่และเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรทราบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรรีก เหล่าประเสริฐ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๒ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๐๒

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๔๘ ๐๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๑๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่รับ.....
วัน/เดือน/ปี ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๐๐

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคคอตีบหวัดแอฟริกาในสุกร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สถานการณ์การเกิดโรคระบาดของโรคคอตีบหวัดแอฟริกาในสุกร

จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน

และควบคุมโรคคอตีบหวัดแอฟริกาในสุกร (Contingency plan)*

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคคอตีบหวัดแอฟริกาในสุกรของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารงานและขับเคลื่อนมาตรการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามแผน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคคอตีบหวัดแอฟริกาในสุกรแห่งชาติ เพื่อกำหนดนโยบายและแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคคอตีบหวัดแอฟริกาในสุกร กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและผู้ได้รับผลกระทบ การอำนวยการ สนับสนุนกลไกตามแผนเตรียมความพร้อมฯ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประกอบกับพบการระบาดของโรคคอตีบหวัดแอฟริกาในสุกรในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโรคคอตีบหวัดแอฟริกาในสุกรเข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคคอตีบหวัดแอฟริกาในสุกร จึงขอให้จังหวัดแจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ หรือเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร ทราบและพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. โรคคอตีบหวัดแอฟริกาในสุกร เป็นโรคไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่เป็นอันตรายต่อสุกร เนื่องจากเป็นโรคแล้วตายไม่มีทางรักษา เชื้อมีความคงทนในสิ่งแวดล้อมหลายปี เมื่อสัตว์ติดโรคแล้วมีโอกาสตายสูงและเป็นพาหะได้ตลอดชีวิตเชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิต โรคนี้มีความรุนแรงทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบร้อยละ ๑๐๐

๒. สุกรติดโรคได้จากการสัมผัสหรือได้รับเชื้อโดยตรงจากสุกรป่วย (Direct contact) ติดต่อโดยอ้อม (Indirect contact) โดยได้รับเชื้อปนเปื้อนในอาหาร คน ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เสื้อผ้า ที่ปนเปื้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินเศษอาหารที่มีเนื้อสุกรที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสผสมอยู่ หรือติดต่อกับเห็บอ่อนกัด (genus Ornithodoros) ซึ่งพบในสุกรป่า เมื่อสุกรติดเชื้อมีระยะฟักตัวนาน ๕ - ๑๕ วัน สุกรจะมีอาการไข้สูง นอนสุมกันร่วมกับท้องเสียเป็นเลือด ผิวน้ำแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง ไอ แห้ง และขาหลังไม่มีแรง โดยสุกรมีอัตราการตายร้อยละ ๑๐๐ เมื่อแสดงอาการ

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ขอความร่วมมือกับปศุสัตว์ในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังการนำเข้าสุกรมีชีวิต จากสุกร และผลิตภัณฑ์จากสุกรในประเทศที่มีการระบาดเข้าประเทศไทย


/๔. แจ้งคำแนะนำ ...

๔. แจ้งคำแนะนำเกษตรกรในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยสังเกตอาการสุกรทุกวัน หากพบการตายของสุกรแบบเฉียบพลันมากกว่าร้อยละ ๕ ใน ๒ วัน หรือในฟาร์มย่อยที่มีจำนวนสุกรน้อยกว่า ๕๐ ตัว มีการตายเฉียบพลัน ตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน หรือ สุกรมีอาการป่วย ตามข้อ ๒ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อำเภอ หรือ call center : ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือ application DLD 4.0

๕. ประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan) และแนวทางเวชปฏิบัติของอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline) ให้ประชาชนในพื้นที่และเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ได้ที่เว็บไซต์ <https://qr.go.page.link/QniVa> หรือ QR Code ท้ายเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



<https://qr.go.page.link/QniVa>

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗

ผู้ประสานงาน นางสาวสาวิตรี คล้ายจินดา/นายจักรพงษ์ สุขใส